

VACINA	Nasc.	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	5 anos	10 anos	25 anos	45 anos	65 anos	10/10 anos
Hepatite B	VHB 1	VHB 2		VHB 3								
<i>Haemophilus influenzae b</i>		Hib 1	Hib 2	Hib 3		Hib 4						
Difteria, tétano, tosse convulsa		DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3		DTPa 4	DTPa 5					
Poliomielite		VIP 1	VIP 2	VIP 3		VIP 4	VIP 5					
<i>Streptococcus pneumoniae</i>		Pn <sub>13</sub> 1	Pn <sub>13</sub> 2		Pn <sub>13</sub> 3							
<i>Neisseria meningitidis B (a)</i>		MenB	MenB		MenB							
<i>Neisseria meningitidis C</i>					MenC 1							
Vírus do Papiloma humano (b)								HPV 1,2				
Sarampo, Parotidite epidémica, Rubéola					VASPR 1		VASPR 2					
Tétano, difteria e tosse convulsa (c)									Tdpa - Grávidas			
Tétano e difteria (d)								Td6	Td7	Td8	Td9	Td10

(a) MenB aplicável aos nascidos de  $\geq 2019$

(b) HPV: também ao sexo masculino, aos nascidos  $\geq 2009$ . Esquema 0, 6 meses.

(c) Aplicável apenas a mulheres grávidas. Uma dose em cada gravidez.

(d) Td: De acordo com a idade, devem ser aplicados os intervalos recomendados entre doses, tendo como referência a data de administração da dose anterior. A partir dos 65 anos, recomenda-se a vacinação de todas as pessoas que tenham feito a última dose de Td há  $\geq 10$  anos; as doses seguintes são administradas de 10 em 10 anos.